**CARCINOMA
DIFFERENZIATO
DELLA TIROIDE:
DALLA DIAGNOSI
AL FOLLOW-UP**

Le questioni aperte,
le risposte possibili

CARCINOMA DIFFERENZIATO DELLA TIROIDE: DALLA DIAGNOSI AL FOLLOW-UP

Bologna, 21 Marzo 2009

METASTASI A DISTANZA: RUOLO DELLA CHIRURGIA PER LE METASTASI ENDOTORACICHE

MAURIZIO BOARON

**Div. Di CHIRURGIA TORACICA
OSPEDALI MAGGIORE-BELLARIA – Bologna**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

CENNI STORICI

1939

Primo caso riportato di paziente lungo-sopravvivate dopo resezione polmonare per carcinoma metastatico a cellule renali

Barney JD. J Urol 1939

1965

Thomford pubblica la prima “grossa” casistica di metastasectomie polmonari

- ▶ *205 pazienti*
- ▶ *Sopravvivenza globale a 5 aa: 30.3%*

Thomford NR. J Thorac and Cardiovasc Surg 1965

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

INDICAZIONI: BASI TEORICHE

TEORIA DEL "PROCESSO DI DIFFUSIONE A CASCATA"

▶ Le metastasi ematogene non rappresentano necessariamente una diffusione **SISTEMICA** della malattia

▶ Possono essere considerate uno stadio **PRE-SISTEMICO** qualora localizzate unicamente in organi "key-site"

POLMONE –FEGATO

EXERESI CHIRURGICA

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

INDICAZIONI

PRINCIPI FONDAMENTALI DI INDICAZIONE CHIRURGICA

- *Buona performance status – rischio chirurgico accettabile*
- *Controllo del tumore primitivo*
- *Assenza di metastasi extrapolmonari*
- *Resecabilità delle metastasi polmonari (anche se bilaterali)*

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

INDICAZIONI

INDICAZIONI CHIRURGICHE ACCESSORIE

- *Programmi terapeutici multimodali (chemioterapia + chirurgia)*
- *Difficoltà nella diagnosi differenziale con un tumore primitivo polmonare*
- *Assenza di alternative terapeutiche*
- *Presenza di sintomi (PNX – Emoftoe)*

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

RISULTATI : SOPRAVVIVENZA GLOBALE

<i>Author</i>	<i>Year</i>	<i>No.</i>	<i>Survival</i>		<i>Favorable prognostic factors</i>
			<i>5-Yrs</i>	<i>10Yrs</i>	
<i>McCormack</i>	<i>1979</i>	<i>35</i>	<i>22 %</i>	<i>---</i>	<i>Dukes' A & B DFI, number</i>
<i>Mansel</i>	<i>1986</i>	<i>66</i>	<i>38 %</i>	<i>---</i>	<i>Solitary Age, sex, size, location</i>
<i>Goya</i>	<i>1989</i>	<i>62</i>	<i>42 %</i>	<i>22%</i>	<i>Solitary, size</i>
<i>McCormack</i>	<i>1992</i>	<i>144</i>	<i>40 %</i>	<i>30%</i>	<i>Complete Resection (CR)</i>
<i>Van Halteren</i>	<i>1995</i>	<i>38</i>	<i>43 %</i>	<i>---</i>	<i>Number</i>
<i>Okumura</i>	<i>1996</i>	<i>159</i>	<i>40 %</i>	<i>27.7%</i>	<i>Number, Age, sex, location</i>
<i>Girard</i>	<i>1996</i>	<i>86</i>	<i>24 %</i>	<i>20%</i>	<i>CR, CEA, number Age, sex, size</i>
<i>Inoue</i>	<i>2000</i>	<i>25</i>	<i>39 %</i>	<i>---</i>	<i>Lymphnodes negative (LN)</i>
<i>Saito</i>	<i>2002</i>	<i>165</i>	<i>39 %</i>	<i>---</i>	<i>LN Liver</i>
<i>Pfannschmidt</i>	<i>2003</i>	<i>167</i>	<i>32 %</i>	<i>---</i>	<i>Number, CEA</i>

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

FATTORI PROGNOSTICI: NUMERO

Parametro statisticamente rilevante (ev in correlazione all'istotipo)

Pastorino U. J Thorac Cardiovasc Surg 1997

Parametro di discutibile rilevanza

*Protopapas A. Anna Thorac Surg 2001
Robert JH. Ann Thorac Surg 1997*

Non rilevante la bilateralità o la resezione iterativa

Pastorino U. J Thorac Cardiovasc Surg 1997

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

FATTORI PROGNOSTICI: INTERVALLO LIBERO

Nella analisi del Registro Internazionale delle Metastasi Polmonari è considerato un fattore prognostico “rilevante”

Pastorino U. J Thorac Cardiovasc Surg 1997

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

FATTORI PROGNOSTICI: ADENOPATIE

La presenza di adenopatie polmonari e/o mediastiniche ha rilevanza prognostica negativa nella maggioranza delle casistiche (correlata all'istotipo)

*Pastorino U. J Thorac Cardiovasc Surg 1997
Pairolero PC: Ann Thorac Surg 2004
Pfannschmidt J. Ann Thorac Surg 2002*

Prognosi particolarmente grave in caso di linfangite

Sawin SW. Int J Gynaecol Obstet. 1995

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

FATTORI PROGNOSTICI: MARKERS

Un valore preoperatorio elevato di CEA è considerato prognosticamente sfavorevole

*Headrick Jr. Ann Thorac Surg 2001
Saito Y. J Thorac Cardiovasc Surg 2002
Inoue Y. Ann Thorac Surg 2004*

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

FATTORI PROGNOSTICI: ISTOTIPO

INTERNATIONAL REGISTRY OF LUNG METASTASIS tot: 5206

▶ <i>Sarcomi dei tessuti molli</i>	751	14.4 %
▶ <i>Osteosarcomi</i>	734	14.0 %
▶ <i>Tumori colo-rettali</i>	645	12.3 %
▶ <i>Neoplasie mammarie</i>	396	7.6 %
▶ <i>Neoplasie renali</i>	372	7.1 %
▶ <i>Melanoma</i>	282	5.4 %
▶ <i>Neoplasie del distretto cervico facciale</i>	247	4.7 %

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

FATTORI PROGNOSTICI: ISTOTIPO

<i>Istotipo tumore primitivo</i>		<i>Sopravvivenze a 5 aa</i>
▶ <i>Tumori del Testicolo</i>	<i>50 %</i>	
▶ <i>Sarcomi tessuti molli</i>		<i>25 %</i>
▶ <i>Osteosarcoma</i>		<i>20-40 %</i>
▶ <i>Ca. Coloretale</i>		<i>8- 37 %</i>
▶ <i>Ca. Renale</i>		<i>13 – 50 %</i>
▶ <i>Ca. Mammario</i>		<i>14 – 49 %</i>
▶ <i>Ca Testa-Collo</i>		<i>40 – 50 %</i>

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

METASTASI DA TUMORI DELLA TIROIDE

“ Metastatic disease develops in 7% to 23% of patients with differentiated thyroid cancer and another 1% to 4% present with distant disease at the time of initial diagnosis... “

Shoup M. J Am Coll Surg 2003

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

METASTASI DA TUMORI DELLA TIROIDE

Il polmone rappresenta il sito di localizzazione più frequente seguito dallo scheletro

“... Patients with either bone only or lung only metastasis had an improved survival compared with other sites with more than one site “

Shoup M. J Am Coll Surg 2003

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

METASTASI DA TUMORI DELLA TIROIDE

“ Long term survival rates after diagnosis of metastatic differentiated thyroid cancer range from 13% to 100% ”

Schlumberger M. J Clin Endocrinol Metab 1986

Ruegemer JJ. J Clin Endocrinol Metab 1988

Shaha AR. AmJ Surg 1997

Brink JS. Surgery 2000

La Quaglia MP. J Pediatr Surg 2000

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

METASTASI DA TUMORI DELLA TIROIDE

Le sostanziali differenze di sopravvivenza nelle casistiche riportate in letteratura sono dovute alla grande disomogeneità dei gruppi di pz :

- ▶ *Tempi di sviluppo delle metastasi*
- ▶ *Età dei pazienti*
- ▶ *Sito delle metastasi ed estensione*
- ▶ *Istologia*
- ▶ *Trattamento*

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

METASTASI DA TUMORI DELLA TIROIDE

FATTORI PROGNOSTICI

Età alla diagnosi

	sopravv a 10 aa	p value
< 45 aa	58 %	< 0,0001
> 45 aa	13 %

Sito della metastasi

Osso (localizzazione unica)	27 %	0,0004
Polmone (localizzazione unica)	32 %	
Due o più organi	17%	

Casistica di 242 pz con metastasi da tumori differenziati della tiroide
1941-2000 - Memorial Sloan Kettering Cancer Research Center

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

METASTASI DA TUMORI DELLA TIROIDE

FATTORI PROGNOSTICI

Presentazione clinica

	sopravv a 10 aa	p value
Comparsa di sintomi	11 %	< 0,0001
Imaging	45 %

Trattamento con Radio-iodio

Si	33 %	< 0,0001
No	12 %	

Casistica di 242 pz con metastasi da tumori differenziati della tiroide
1941-2000 - Memorial Sloan Kettering Cancer Research Center

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

METASTASI DA TUMORI DELLA TIROIDE

TRATTAMENTO

“Once distant recurrence is diagnosed, optimal treatment is controversial . . . “

Shoup M. J Am Coll Surg 2003

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

METASTASI DA TUMORI DELLA TIROIDE

TRATTAMENTO

L'exeresi chirurgica delle metastasi toraciche da tumori differenziati della tiroide rappresenta una valida opzione terapeutica solo in casi selezionati

- ▶ *Assenza di localizzazioni extratoraciche*
- ▶ *Età / Performance status*
- ▶ *Numero (?)*
- ▶ *Pazienti "non fit" al trattamento con Radioiodio*
- ▶ *Intervallo libero*

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

TECNICA

INTERVENTI RESETTIVI

- ▶ ***Resezione atipica***
- ▶ ***Segmentectomia***
- ▶ ***Lobectomia***
- ▶ ***Pneumonectomia***

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

TECNICA

ACCESSO

- ▶ *Toracotomie (ev simultanee od iterative)*
- ▶ *Sternotomie*
- ▶ *Bitoraco-sternotomia*
- ▶ *VATS*

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

TECNICA

VATS

- ▶ *Resezione atipica*
- ▶ *Lobectomia*

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

TECNICA

VATS

- ▶ *Indicata per le lesioni singole e superficiali*
- ▶ *Mini-invasività*
- ▶ *Migliore outcome postoperatorio*

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

TECNICA

PITFALLS

VATS

- ▶ *Impossibilità di palpare manualmente il polmone*
- ▶ *Difficoltoso accesso alle lesioni profonde*
- ▶ *Difficoltà di localizzazione (visiva) delle metastasi*

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

TECNICA

RESEZIONI LASER

Nd YAG Laser 1318 nm
RESEZIONE, COAGULAZIONE ED AEROSTASI

*Risparmio
parenchima*

*Intervento su lesioni
centrali*

*Intervento su metastasi
multiple, bilaterali e sincrone*

*Reintervento per
metastasi
metacrone*

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

TECNICA

RESEZIONI LASER

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

LA NOSTRA ESPERIENZA

1993 – 2009

▶ <i>Pazienti sottoposti a metastasectomia polmonare</i>	201
▶ <i>Pazienti con neoplasia primitiva differenziata della tiroidea</i>	5
<i>Carcinoma papillifero</i>	2
<i>Carcinoma follicolare</i>	3

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

LA NOSTRA ESPERIENZA

▶ <i>Interventi chirurgici</i>	9
<i>Resezioni polmonari Laser / Pneumotomie</i>	19
<i>Wedge resections</i>	23
<i>Lobectomie</i>	1
▶ <i>Totale metastasi asportate</i>	43
▶ <i>Follow-up:</i>	
<i>4 pazienti attualmente viventi</i>	
<i>1 paziente deceduto dopo 33 mesi</i>	

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

CONCLUSIONI

“ Patients with pulmonary metastases from thyroid and other head and neck cancers undergoing complete resection of all their lesions can have long-term survival even if there are multiple metastases “

Liu MD. Ann Surg Oncol 1999

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

CONCLUSIONI

- *Non essendo ancora chiaramente definito il ruolo terapeutico della metastasectomia è opportuna una attenta selezione chirurgica che privilegi candidati con parametri biologici e tecnici favorevoli*
- *L'impiego di tecniche mini-invasive e/o l'impiego routinario del laser per resezioni atipiche consente di minimizzare il trauma chirurgico e il danno funzionale correlato alla resezione*

CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI

CONCLUSIONI

“ Optimal treatment of patients with metastatic disease remains unclear and must be more closely scrutinized in future studies ”

Shoup M. J Am Coll Surg 2003