

FARMACI CONTENENTI TESTOSTERONE E AUMENTO DEL RISCHIO CARDIACO

Responsabile Editoriale
Vincenzo Toscano

Il Comitato di Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza dell'EMA (PRAC) ha completato a livello dell'UE la revisione dei medicinali contenenti testosterone, a seguito di problematiche relative a gravi effetti avversi a livello cardiovascolare, compreso l'infarto. **La revisione del PRAC non ha trovato evidenze coerenti del fatto che l'uso di testosterone negli uomini affetti da ipogonadismo aumenti il rischio di problemi cardiaci.**

Il comitato ha ritenuto che **i benefici del testosterone continuano a superare i rischi** e ha raccomandato che i medicinali contenenti testosterone debbano essere usati solo quando il deficit di testosterone è stato confermato da segni, sintomi ed esami di laboratorio.

EMA. La revisione del PRAC non conferma l'aumento dei problemi cardiaci con medicinali contenenti testosterone. [EMA/611318/2014](http://ema.europa.eu/611318/2014).



Commissione Farmaci AME

Raffaele Volpe (Coordinatore) (rafaelfox@libero.it)
Agostino Paoletta, Agostino Specchio, Davide De Brasi, Enrica Ciccarelli

A cura di:
Renato Cozzi