

ORBITOPATIA BASEDOWIANA

CAS (Clinical Activity Score)

Assegna un punto per ogni elemento positivo:
punteggio max = 7; significativo se > 3

- ☯ dolore retrobulbare spontaneo
- ☯ dolore con il movimento oculare
- ☯ eritema palpebrale
- ☯ iniezione congiuntivale
- ☯ chemosi (edema congiuntivale)
- ☯ rigonfiamento caruncola
- ☯ edema palpebrale

NOSPECS (Score gravità)

0. **N**on segni o sintomi
1. **O**nly segni senza sintomi (apertura palpebrale in mm)
2. **S**oft coinvolgimento dei tessuti molli (gonfiore e rossore)
3. **P**roptosi (esoftalmo in mm)
4. **E**xtraoculari coinvolgimento dei muscoli (punteggio diplopia, angoli di duzione)
5. **C**orneale coinvolgimento (cheratopatia puntata, ulcere)
6. **S**ight perdita visiva (coinvolgimento nervo ottico): migliore acuità corretta, visione colori, campimetria, fundus

Lieve: moderato coinvolgimento tessuti molli, lieve proptosi (fino a 23-24 mm), diplopia intermittente

Moderato: tutto quello che c'è fra lieve e molto grave

Severo: classe 6

Score diplopia

0. Assente
1. intermittente (in posizione primaria se stanco o al risveglio)
2. incostante (agli estremi di lateralità)
3. costante