

COMUNICATO STAMPA EMA SULLE TERAPIE BASATE SUL GLP-1 (INCRETINO-MIMETICI) NEL TRATTAMENTO DEL DIABETE DI TIPO 2

Responsabile Editoriale
Vincenzo Toscano

Un gruppo di ricercatori indipendenti ha recentemente segnalato un aumentato rischio di pancreatiti e metaplasia dei dotti pancreatici in pazienti affetti da diabete mellito tipo 2 in trattamento con inibitori della dipeptidil-peptidasi e agonisti del recettore del GLP-1.

È doveroso segnalare che si tratta di un piccolo studio che riguarda l'indagine autoptica di 34 donatori d'organo deceduti per cause diverse. Lo studio confronta le caratteristiche pancreatiche di 20 soggetti diabetici (8 in trattamento con farmaci attivi sull'asse delle incretine e 12 in trattamento con altri farmaci) e 14 controlli.

Il Comitato dell'Agenzia per i medicinali per uso umano e il comitato di valutazione per la farmacovigilanza stanno esaminando quanto segnalato dai ricercatori, per valutare la necessità di eventuali interventi da parte dell'ente regolatorio.

L'Agenzia Europea EMA al momento non ha espresso alcun giudizio conclusivo su tali verifiche. Di conseguenza **allo stato attuale non vi sono cambiamenti per i medici circa le raccomandazioni sull'uso di questi medicinali né si rende necessario per i pazienti interrompere la loro assunzione.**

Si allega: [Comunicato Stampa EMA](#), Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - 26 marzo 2013.